NOTA SOBRE UNA FOCA CANGREJERA *(LOBODON CARCINOPHAGUS)* CAPTURADA EN PUERTO MADRYN, CHUBUT. *(PHOCIDAE, PINNIPEDIA)*

Por José Alejandro Scolaro (*)

Esta especie de distribución circumpolar raramente se encuentra al norte de la Convergencia Antártica, en el Hemisferio Sur. Así lo señala Scheffer (1958) citando unos pocos ejemplares observados o capturados en Australia, Nueva Zelandia, Tasmania y Sud América.

En nuestro continente, son varios los autores que han hecho referencia a la presencia de esta foca fuera de su habitat antártico.

Así Berg (1898) cita dos ejemplares procedentes del Río de La Plata. También Cabrera y Yepes (1960) consideran a la foca cangrejera de distribución antártica, siendo factible su encuentro en las costas patagónicas. Mencionan a un ejemplar hallado en San Isidro, Buenos Aires, sobre la costa del río de la Plata, como el más septentrional colectado.

A su vez, King (1964) y Vaz-Ferreira (1965) citan a la especie para las costas uruguayas. Este último autor menciona un ejemplar capturado en Río de Janeiro, Brasil. Por su parte, Ximénez (1964) considera a esta foca como visitante ocasional del Río de La Plata y cita la captura de un animal en el Puerto de Montevideo.

También Ximénez *et al* (1972), en un catálogo de mamíferos del Uruguay, mencionan para la especie cráneos depositados en el Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo y en el Servicio Oceanográfico y Pesca, Uruguay.

En la presente nota se establece una nueva cita para la especie en base a un ejemplar capturado el 9 de junio de 1976 en las playas de Puerto Madryn (lat. 42° 46' S - long. 65° 02' W), en la provincia del Chubut.

Material examinado

De acuerdo a las normas acordadas por el Committee of Marine Mammals, de la American Society of Mammalogists (1967), se tomaron las siguientes medidas morfológicas standard:

Sexo: hembra; peso total: 125 Kg; longitud standard: 1.96 m; longitud aleta anterior: 32.4 cm; longitud aleta posterior: 37.0 cm;

(*) Centro Nacional Patagónico - Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos - Puerto Madryn, Chubut.

grosor axilar: 1.17 m; ancho rostral: 7.0 cm; largo cola: 13.4 cm; ancho cola: 6.4 cm; espesor del panículo adiposo: 3.2 cm.

Diagnosis craneana: Ancho zigomático ZW: 14.1 cm; longitud condilobasal CBL: 25.3 cm; longitud basilar de Hensel BLH: 22.0 cm; ancho calvariano MW: 15.3 cm; ancho interorbital IOW: 4.3 cm; longitud serie dentaria postcanina superior LUTR: 6.8 cm.

El cráneo del ejemplar se encuentra registrado bajo el Nº CNP 003 y depositado en la colección del Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut.

Observaciones

En un trabajo reciente Øritsland (1970), resume las principales características ecológicas, biológicas y etológicas de la especie, destacándola como de pronunciados hábitos pelágicos. Sin embargo sus migraciones son principalmente periantárticas, ocupando un habitat alejado de la costa. En general existe preferencia por los hielos y témpanos flotando a la deriva, donde acostumbra permanecer largo tiempo descansando (Aguayo y Torres, 1975). Algunos aspectos importantes de su biología y comportamiento, permanecen aún desconocidos.

El ejemplar capturado, teniendo en cuenta los trabajos de Øritsland (1970), puede considerarse como una hembra adulta o subadulta. entre los 3-5 años de edad. En su disección no se encontraron signos de preñez. Tampoco fue posible encontrar para su análisis, ningún contenido estomacal. En cambio en el tracto intestinal fueron identificadas heces de color rojo anaranjado características del pigmento de los eufausidos (krill) que constituyen su alimento principal.

La piel presentaba un color blanco-cremoso plateado, característico de la época invernal.

Agradecimientos

A las autoridades y personal de la Prefectura Naval Argentina, de Puerto Madryn por la colaboración prestada.

BIBLIOGRAFIA

AGUAYO, A. y TORRES, D., 1975. — *Pub. Inst. Antart. Chil. Serie Cientifica* **3** (1): 87.

BERG, C., 1898. — *Com. Mus. Nac. Bs. Aires*, **1**: 15.

CABRERA, A. y YEPES, J., 1960. — Mamíferos Sudamericanos. Ed. Ediar, Bs. As. Tomo **1**: 184-185.

KING, J. E., 1964. — Seals of the World. *Brit. Mus. Nat. Hist.* London: 154 pp.

ØRITSLAND, 1970. — Antarctic Ecology. Ed. Holdgate, *M. W. Academic Press.* Vol. 1. London: 362-376.

SCHEFFER, V. B., 1958. — Seals, sea lions and walruses. Stanford Univ. Press: 179 pp.

VAZ - FERREIRA, R., 1965. — *An. Acad. Bras. Cienc.* 37: 180-191.

XIMÉNEZ, A., LANGGUTH A. y PRADERI, R., 1972. — *An. Mus. Nac. Hist. Nat. Montevideo,* 2ª Serie, 7 (5): 49 pp.

XIMÉNEZ, I., 1964. — *Bol. Inst. Biol. Mar. Mar del Plata* 7: 65-72.

SUMMARY. — Occurrence of a crabeater seal, Lobodon carcinophgus, is mentioned for Pto. Madryn far North from its antarctic distribution. Zoometric standard measures and craneal diagnosis are recorded.

II CONGRESO ARGENTINO DE PALEONTOLOGIA Y BIOESTRATIGRAFIA Y I CONGRESO LATINOAMERICANO DE PALEONTOLOGIA.

Se realizará en la ciudad de Buenos Aires, entre los dias 2 y 6 de abril de 1978, auspiciado por la Asociación Paleontológica Argentina. Se halla abierta ya la inscripción para el mismo; la información pertinente puede ser solicitada a la Sede Oficial, sita en Maipú 645, piso 1º, 1006 - Buenos Aires.

El temario abarca diversas disciplinas: Paleozoología, Paleobotánica, Palinología Micropaleontología, Paleoecología Paleobiología, Biogeografía histórica, Evolución, Bioestratigrafía, Taxonomía y Nomenclatura, etcétera.

La Comisión Organizadora del Congreso aspira a lograr una activa participación, tanto de los investigadores dedicados a la Paleontologia como de aquellos que desarrollan su labor en ámbitos de la Biologia y Geologia eventualmente relacionados. S.Z.D.P.